




Flecainide / FlexMed
Οξική φλεκαϊνίδη / Flecainide acetate

Τι είναι η Φλεκαϊνίδα;


Η φλεκαϊνίδα είναι ένα αντιαρρυθμικό φάρμακο τάξης Ic (κατά Vaughan-Williams).^[1]

Αποτελεί μια ταχεία, αποτελεσματική επιλογή για τον έλεγχο ρυθμού στην κοιλιακή μαρμαρυγή και σε ταχυαρρυθμίες επανεισόδου, εφόσον χρησιμοποιείται σε κατάλληλα επιλεγμένους ασθενείς και υπό παρακολούθηση.



Μηχανισμός Δράσης

- Αναστολή ρευμάτων Na (INa): καθυστέρηση εκπόλωσης.
- Επιβράδυνση αγωγής σε κοιλιακό και κοιλιακό μυοκάρδιο καθώς και στα παραπληρωματικά δεμάτια (AVRT, προδιεγερμένη ΚΜ).
- Παράταση QRS. - Δοσοεξαρτώμενη παράταση QRS.
- Αύξηση ανερέθιστης περιόδου στους κόλπους και αναστολή κυκλωμάτων επανεισόδου.^[6]
- Χρόνος ημίσειας ζωής: 15 ώρες.



Χορήγηση



Πίνακας Δοσολογίας – Χορήγησης

	Αρχική δόση	Μέγιστη δόση
Ενήλικες με φυσιολογική λειτουργία	2 mg/kg IV (μέγιστο 150 mg) σε 10-30 λεπτά	150 mg
Επανάληψη δόσης	1 mg/kg IV μετά από μερικές ώρες αν δεν επιτευχθεί ανάταξη	≤600 mg/24h
Νεφρική ανεπάρκεια (CrCl ≤35 mL/min)	1-1,5 mg/kg (μέγιστο 100 mg)	100 mg

Συνεχής παρακολούθηση ΗΚΓ, ΑΠ, εύρους QRS κατά την χορήγηση.

Ενδείξεις (ESC Guidelines)

Ενδείξεις

- Κολπική Μαρμαρυγή (Ένδειξη IA)
- Κολποκοιλιακή Ταχυκαρδία Επανεισόδου
- Κολπική Ταχυκαρδία (AT)


Αντενδείξεις

- Σοβαρή δομική καρδιοπάθεια, καρδιακή ανεπάρκεια ή στεφανιαία νόσος.
- Σύνδρομο Brugada.
- Σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (CrCl < 35 ml/min/1.73m²).
- Κολποκοιλιακός αποκλεισμός ή νόσος φλεβοκόμβου χωρίς παρουσία βηματοδότη.
- Σε ανάταξη κολπικού πτερυγισμού να μην χορηγείται χωρίς συγχορήγηση β-αποκλειστή.

Προσοχή:

- Παρακολούθηση QRS: διακοπή εάν διεύρυνση >25% ή εμφάνιση αποκλεισμού σκέλους.
- Αποφυγή σε ασθενείς με δομική καρδιοπάθεια, στεφανιαία νόσο ή μειωμένο κλάσμα εξώθησης.

Κολπική Μαρμαρυγή (ΚΜ) – 2024 Guidelines ^[2]



- Φαρμακευτική ανάταξη πρόσφατης έναρξης ΚΜ σε ασθενείς χωρίς σοβαρή δομική καρδιοπάθεια.
- ESC 2024: Κλάση I, Επίπεδο A.
- Επιτυχία 52-95% μέσα σε 3-8 ώρες.

Intravenous flecainide or propafenone is recommended when pharmacological cardioversion of recent-onset AF is desired, excluding patients with severe left ventricular hypertrophy, HFrEF, or coronary artery disease.




- Προδιεγερμένη ΚΜ (αιμοδυναμικά σταθερή): μπορεί να χρησιμοποιηθεί (Κλάση IIb, Επίπεδο B).

Γιατί Ενδοφλέβια Φλεκαϊνίδη για ανάταξη Κολπικής Μαρμαρυγής;

Από μετανάλυση φαρμακευτικών ανατάξεων με αντιαρρυθμική αγωγή σε 6031 ασθενείς ^[3] και σε προοπτική μελέτη 150 ασθενών. ^[4]

- Γρηγορότερη ανάταξη σε φλεβοκμβικό ρυθμό με φλεκαϊνίδη.
- Υπεροχή της φλεκαϊνίδης έναντι των άλλων φαρμάκων της κατηγορίας Ic και των άλλων τάξεων αντιαρρυθμικών.
- Ισορροπία αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, σε ασθενείς που δύναται να λάβουν φλεκαϊνίδη.
- Η φλεκαϊνίδη έχει λιγότερες μακροχρόνιες ανεπιθύμητες ενέργειες.




Κολποκοιλιακή Ταχυκαρδία Επανεισόδου (AVRT) [5]

- Αν αποτύχουν οι βαγοτονικοί χειρισμοί ή η αδενοσίνη, η IV φλεκαϊνίδη συνιστάται (Κλάση IIa, Επίπεδο B).
- Αποτελεσματική τόσο σε ορθόδρομη όσο και σε αντίδρομη AVRT.

In antidromic AVRT, i.v. ibutilide or procainamide or i.v. flecainide or propafenone or synchronized DC cardioversion should be considered if vagal manoeuvres and adenosine fail *21.422,429,437


IIa

B



Κολπική Ταχυκαρδία (AT) [5]

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία δεύτερης γραμμής (Κλάση IIa/IIb).
- Ενδείκνυται σε αποτυχία αδενοσίνης, βεραπαμίλης/διλτιαζέμης ή β-αποκλειστών.



Πηγές

- [1] Arunachalam K, Patel P. Flecainide. 2025 Nov 28. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. PMID: 31194431.
- [2] Isabelle C Van Gelder, et al. , 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): Developed by the task force for the management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC), with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. Endorsed by the European Stroke Organisation (ESO), European Heart Journal, Volume 45, Issue 36, 21 September 2024, Pages 3314–3414, <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae176>
- [3] Tsiachris D, Doundoulakis I, Pagkalidou E, Kordalis A, Deftereos S, Gatzoulis KA, Tsioufis K, Stefanadis C. Pharmacologic Cardioversion in Patients with Paroxysmal Atrial Fibrillation: A Network Meta-Analysis. Cardiovasc Drugs Ther. 2021 Apr;35(2):293-308. doi: 10.1007/s10557-020-07127-1. Epub 2021 Jan 5. PMID: 33400054.
- [4] Martínez-Marcos FJ, García-Garmendia JL, Ortega-Carpio A, Fernández-Gómez JM, Santos JM, Camacho C. Comparison of intravenous flecainide, propafenone, and amiodarone for conversion of acute atrial fibrillation to sinus rhythm. Am J Cardiol. 2000 Nov 1;86(9):950-3. doi: 10.1016/s0002-9149(00)01128-0. PMID: 11053705.
- [5] Josep Brugada, et al. , 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. The Task Force for the management of patients with supraventricular tachycardia of the European Society of Cardiology (ESC): Developed in collaboration with the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), European Heart Journal, Volume 41, Issue 5, 1 February 2020, Pages 655–720, <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz467>
- [5] Lavalle, C.; Trivigno, S.; Vetta, G.; Magnocavallo, M.; Mariani, M.V.; Santini, L.; Forleo, G.B.; Grimaldi, M.; Badagliacca, R.; Lanata, L.; et al. Flecainide in Ventricular Arrhythmias: From Old Myths to New Perspectives. J. Clin. Med. 2021, 10, 3696. <https://doi.org/10.3390/jcm10163696>

Flecainide / FlexMed

Οξική φλεκαϊνίδα
10 mg/ml Διάλυμα για ένεση / έγχυση
5 φύσιγγες x 15 ml

Ενδείξεις:

- Κολπική Μαρμαρυγή (Ένδειξη IA)
- Κολποκοιλιακή Ταχυκαρδία Επανεισόδου
- Κολπική Ταχυκαρδία (AT)



FlexMed®

REDEFINING HEALTH

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας / Marketing Authorization Holder:
FLEXMED TECHNOLOGIES & INNOVATIONS IKE
Σεμιτέλου 6, 11528 Αθήνα. Τηλ: 210 220 3333
FLEXMED TECHNOLOGIES & INNOVATIONS P.C.
6, Semitelou str., 11528 Athens. Tel: +30 210 220 3333
Αρ. Αδ. Κυκλοφ / Marketing Authorization No: 72168/1-7-2025

www.flexmed.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»